

이트라코나졸 성분 제제 허가사항 변경(안)

'2. 다음 환자에는 투여하지 말 것' 항

1) ~ 2) <생략>

3) <생략> 구체적인 약물은 '6. 상호작용' 항에 기재되었으며, 이 약과 병용 금기인 일부 약물은 다음과 같다.

<중략>

항응고 및 항혈전제: 티카그렐라, [다비가트란](#)

항기생충, 항진균 및 항원충제: 할로판트린, [이사부코나조늄](#)

<중략>

4) <생략>

'6. 상호작용' 항

<중략>

약물분류	성분명 예시	임상적 의견
<생략>		
항응고 및 항혈전제	다비가트란	이트라코나졸 투여 중 및 종료 후 2주 간 금기.
<생략>		
항기생충, 항진균 및 항원충제	이사부코나조늄	이트라코나졸 투여 중 및 종료 후 2주 간 금기.
<생략>		

이트라코나졸 성분 제제 허가사항 변경대비표

항목	기허가 사항	변경(안)																																				
<p>2. 다음 환자에는 투여하지 말 것</p>	<p>1) ~ 2) <생략> 3) <생략> 구체적인 약물은 '6. 상호작용' 항에 기재되었으며, 이 약과 병용 금기인 일부 약물은 다음과 같다. <중략> 항응고 및 항혈전제: 티카그렐러 <신설> 항기생충, 항진균 및 항원충제: 할로판트린 <신설> <중략> 4) <생략></p>	<p>1) ~ 2) <생략> 3) <생략> 구체적인 약물은 '6. 상호작용' 항에 기재되었으며, 이 약과 병용 금기인 일부 약물은 다음과 같다. <중략> 항응고 및 항혈전제: 티카그렐러, 다비가트란 항기생충, 항진균 및 항원충제: 할로판트린, 이사부코나조늄 <중략> 4) <생략></p>																																				
<p>6. 상호작용</p>	<p><중략></p> <table border="1" data-bbox="268 987 823 1559"> <thead> <tr> <th>약물분류</th> <th>성분명 예시</th> <th>임상적 의견</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"><생략></td> </tr> <tr> <td>항응고 및 항혈전제</td> <td>다비가트란</td> <td>주의하여 사용. 다비가트란 관련 약물이상 반응을 모니터링하고, 다비가트란의 용량 감량이 필요할 수 있음.</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><생략></td> </tr> <tr> <td>항기생충, 항진균 및 항원충제</td> <td><신설></td> <td><신설></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><생략></td> </tr> </tbody> </table>	약물분류	성분명 예시	임상적 의견	<생략>			항응고 및 항혈전제	다비가트란	주의하여 사용. 다비가트란 관련 약물이상 반응을 모니터링하고, 다비가트란의 용량 감량이 필요할 수 있음.	<생략>			항기생충, 항진균 및 항원충제	<신설>	<신설>	<생략>			<p><중략></p> <table border="1" data-bbox="849 987 1402 1559"> <thead> <tr> <th>약물분류</th> <th>성분명 예시</th> <th>임상적 의견</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"><생략></td> </tr> <tr> <td>항응고 및 항혈전제</td> <td>다비가트란</td> <td>이트라코나졸 투여 중 및 종료 후 2주 간 금기</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><생략></td> </tr> <tr> <td>항기생충, 항진균 및 항원충제</td> <td>이사부코나조늄</td> <td>이트라코나졸 투여 중 및 종료 후 2주 간 금기</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><생략></td> </tr> </tbody> </table>	약물분류	성분명 예시	임상적 의견	<생략>			항응고 및 항혈전제	다비가트란	이트라코나졸 투여 중 및 종료 후 2주 간 금기	<생략>			항기생충, 항진균 및 항원충제	이사부코나조늄	이트라코나졸 투여 중 및 종료 후 2주 간 금기	<생략>		
약물분류	성분명 예시	임상적 의견																																				
<생략>																																						
항응고 및 항혈전제	다비가트란	주의하여 사용. 다비가트란 관련 약물이상 반응을 모니터링하고, 다비가트란의 용량 감량이 필요할 수 있음.																																				
<생략>																																						
항기생충, 항진균 및 항원충제	<신설>	<신설>																																				
<생략>																																						
약물분류	성분명 예시	임상적 의견																																				
<생략>																																						
항응고 및 항혈전제	다비가트란	이트라코나졸 투여 중 및 종료 후 2주 간 금기																																				
<생략>																																						
항기생충, 항진균 및 항원충제	이사부코나조늄	이트라코나졸 투여 중 및 종료 후 2주 간 금기																																				
<생략>																																						