

도네페질염산염 단일제(구강붕해필름)
허가사항 변경대비표

| 구분 | 기 허가사항 | 변경사항 |
|-----------|---|--|
| 용법용량 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 성인 : 도네페질염산염으로서 1일 1회 5 mg씩 취침전 투여한다. 도네페질의 농도가 투여 15일 후 정상상태에 도달하고 이상반응의 빈도가 증량 속도에 의해 영향을 받을 수 있으므로, 4~6주간은 5 mg 용량을 투여하도록 한다. 이 기간 동안의 임상적 반응을 평가한 후 10 mg까지 증량할 수 있다. 1일 10 mg으로 증량하는 경우 소화기계 이상반응에 주의하면서 투여한다. 이 약의 최대 투여량은 10mg이다. 이 약 투여를 중단시 서서히 효과가 감소하며 갑작스러운 투여중단에 의한 반동효과는 나타나지 않는다. 이 약은 구강붕해필름으로 혀 위에 놓고 녹여서 물 없이 복용할 수 있다. ○ 저체중인 85세 이상 여성 환자 : 이상반응이 많이 나타나므로 주의 깊은 모니터링 이 필요하다. 저체중 고령 여성은 1일 5 mg을 넘지 않아야 한다. ○ 소아 : 소아에 대한 사용경험이 없다. | <ul style="list-style-type: none"> ○ 성인 : 도네페질염산염으로서 1일 1회 5 mg씩 취침전 투여한다. 도네페질의 농도가 투여 15일 후 정상상태에 도달하고 이상반응의 빈도가 증량 속도에 의해 영향을 받을 수 있으므로, 4~6주간은 5 mg 용량을 투여하도록 한다. 이 기간 동안의 임상적 반응을 평가한 후 10 mg까지 증량할 수 있다. 1일 10 mg으로 증량하는 경우 소화기계 이상반응에 주의하면서 투여한다. <삭제> 이 약 투여를 중단시 서서히 효과가 감소하며 갑작스러운 투여중단에 의한 반동효과는 나타나지 않는다. 이 약은 구강붕해필름으로 혀 위에 놓고 녹여서 물 없이 복용할 수 있다. ○ 저체중인 85세 이상 여성 환자 : 이상반응이 많이 나타나므로 주의 깊은 모니터링이 필요하다. 저체중 고령 여성은 1일 5 mg을 넘지 않아야 한다. ○ 소아 : 소아에 대한 사용경험이 없다. |
| 사용상의 주의사항 | <p>1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.</p> <p>1) 도네페질염산염, 피페리딘 유도체 또는 이 약의 구성성분에 과민 반응 환자</p> | <p>1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.</p> <p>1) 도네페질염산염, 피페리딘 유도체 또는 이 약의 구성성분에 과민 반응 환자</p> |

| | |
|--|--|
| <p>2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부</p> <p><생략></p> <p>11. 보관 및 취급상의 주의사항</p> <p><생략></p> <p>3) 빛에 의해 변색되는 경우가 있기 때문에 호일포장에서 꺼내지 않고 보관해야 한다.</p> | <p>2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부</p> <p><생략></p> <p>11. 보관 및 취급상의 주의사항</p> <p><생략></p> <p>3) 빛에 의해 변색되는 경우가 있기 때문에 개별포장에서 꺼내지 않고 보관해야 한다.</p> |
|--|--|